


5歳から11歳のお子さまと保護者の方へ

新型コロナワクチンを

受けた後の注意点



待っている間も、感染対策をお願いします。

(マスクをする、隣の人と距離をとる、会話を控えるなど)

新型コロナワクチンを受けたあとは、どんなことに注意すればいいの？

◎ワクチンを受けた後、15分以上はすわって様子をみましょう。
(30分様子をみる場合もあります)



◎当日はお風呂に入るなど、いつもの生活をするのは問題ありませんが、激しい運動はやめましょう。



◎ワクチンを受けると、以下の症状が出ることがありますが、2~3日で自然とよくなることがわかっています。

- ねつ
- だるさ
- 頭のいたみ
- 気持ちわるさ
- おなかをこわす
- さむけ



こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

受けたすぐ後

- 体のかゆさ
- せき



受けた日や4日くらいの間

- ねつ
- だるさ
- 頭のいたみ
- さむけ
- 胸のいたみ
- 胸がドキドキした感じ
- 息くるしさ



新型コロナワクチンの安全性

Q. 子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どんな症状が出ますか？

A. 注射した部分の痛みが一番多く現れます。

ワクチンを受けた後、数日以内に現れる症状は、注射した部分の痛みが一番多く、1回目で74%、2回目で71%でした。注射を受けたすぐ後よりも、受けた日の夜や次の日に痛みを感じる人が多いです。疲れた感じや発熱などは、1回目よりも2回目の後の方が多く現れ、38℃以上の発熱は1回目で2.5%、2回目で6.5%でした。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。

◆数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症状
50%以上	注射した部分の痛み、疲れた感じ
10~50%	頭痛、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気
1~10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

出典：特例承認に係る報告書より

Q. 若い男子ほど接種後に心筋炎を発症しやすいと聞きますが、子どもはどうでしょうか？

A. 米国では、12~17歳男子に比べ5~11歳男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされています。

ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。米国では、新型コロナワクチン接種後の心筋炎の報告率は、5~11歳の男子の方が12~15歳や16~17歳の男子より低いとされています。ワクチン接種後4日程度の間にお子様にも胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

出典：2022.1.5 ACIP Meeting

しんがた かん そうだんさき
新型コロナワクチンに関する相談先

<p>ワクチン接種後に、 からだに異常があるとき</p>	<p>・かかりつけ医 もしくは ・岐阜県の窓口 … ワクチンコールセンター ☎058-272-8222 (毎日9:00~21:00)</p>
<p>ワクチン接種全般に関する お問い合わせ</p>	<p>輪之内町保健センター ☎69-5155 光IP電話 050-8026-8967</p>

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金の給付など）が受けられます※。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

※その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンは2回接種します

● 1回目の接種の方へ

- ・ワクチンの効果を十分得るために、同じワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。
- ・2回目の接種は、本日(1回目) から通常3週間空けて、できるだけお早めに受けてください。*
- ・接種後に現れた症状の種類によっては、2回目の接種を受けない方がよいこともあります。接種後に気になる症状が現れた方は、2回目を受けるかどうかも含めて、ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

※米国やEUの一部の国で、1回目から6週間後までに2回目を接種することを目安としています。

● 2回目の接種の方へ

- ・ワクチン接種はこれで終了になります。
- ・接種後は、1回目と同様に体調に変化がないか注意してください。



まも 守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にあってはなりません。



ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。

<p>みっしゅう ばしょ 密集した場所</p>	<p>みっせつ ばめん 密接した場面</p>	<p>みっぺい くらかん 密閉された空間</p>	<p>ちやくよう マスクの着用</p>	<p>せつ てあら 石けんで手洗い</p>	<p>て ゆび しょうどく 手や指の消毒</p>
-----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 子ども

検索

ホームページをご覧になれない場合は、輪之内町保健センターにご相談ください。



輪之内町保健センター

☎0584-69-5155 光IP電話 050-8026-8967 FAX 0584-69-5156